

مثيرات الربو لدى
إن تناول أدوية الربو يومياً من شأنه أن يساعد في التخفيف من رد فعل
تجاه هذه المثيرات. كما أن تجنب هذه المثيرات كلما أمكن من شأنه أن يساعد
أيضاً.

خطة عمل السيطرة على حالة الربو

املاً هذا النموذج بمساعدة الطبيب
أو الممرضة المتابعة لحالة الربو



إذا كنت تستخدم خطة عمل مكتوبة لمراقبة
حالة الربو، فستقل احتمالات دخولك المستشفى
بسبب حالة الربو لديك بمعدل أربع مرات.*

الاسم والتاريخ:

هل لديك آية أسلمة حول الربو؟
الرجاء الاتصال بالمرضى اللواتي سيشاردن
إلى تقديم المساعدة عبر الخط الهاتفي للمساعدة
0300 222 5800
(٩ صباحاً - ٥ مساءً؛ الاثنين - الجمعة)
www.asthma.org.uk



احرص على استخدامها، ولا يجعلها تفتاك!

خطة العمل عبارة عن دليل شخصي يساعدك على السيطرة على
حالة الربو لديك باستمرار. وب مجرد إنشاء خطة عمل بمساعدة الطبيب
أو الممرضة المتابعة لحالة الربو لديك، فقد تساعدك على البقاء في صحة
وعافية قدر الإمكان.

الأشخاص الذين يستخدمون خطط عمل تقل احتمالات دخولهم
المستشفى بسبب الربو بمعدل أربع مرات.

ستحصل على أفضل النتائج من خطة العمل للحفاظ على صحتك فقط
إذا اتبعت النصائح التالية:

1 ضعها في مكان يسهل عليك وعلى أفراد أسرتك الوصول إليه –
يمكنك محاولة وضعها في باب الثلاجة، أو في ظهر الباب الأمامي،
أو في طاولة جانب السرير. وحاول التقاط صورة لها والاحتفاظ بها
على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي.

2 تفقدتها بانتظام – ضع ملاحظة في مذكرتك، أو تذكيراً على هاتفك
المحمول لقراءة الخطة مرة كل شهر. كيف تدير علاج الربو
اليومي؟ هل تعاني من أي أعراض ربو؟ هل أنت على دراية تامة
بما تفعله؟

3 احتفظ بنسخة بالقرب منها – احفظ صورة على هاتفك أو اجعلها
شاشة توقف أو نشرة مطبوعة في حقيبةك أو مكتبك أو في صندوق
تابلوه السيارة.

4 أعطي نسخة من خطة العمل إلى أحد أفراد الأسرة المهمين
أو إلى صديق عزيز أو شاركهم صورة منها – اطلب منهم قراءة
خطة العمل وتحدث إليهم حول أعراض الربو المعتادة التي تعاني
منها بحيث يمكنهم مساعدتك في ملاحظة بداية ظهور الأعراض،
والتعرف على ما يمكن فعله في حالات الطوارئ.

5 احرص على حملها معك في كل زياراتك الطبية – بما في ذلك
غرفة الطوارئ/الاستشاري. اطلب من طبيبك أو من الممرضة
المتابعة لحالة الربو لديك تحديث الخطة إذا ما نصحوك بإجراء
أي تغييرات عليها. واطلب منهم أيضاً تزويدك بنصائح إذا وجدت
صعوبة في تناول أدوائك على النحو الموصوف لك.

مراجعة حالة الربو لدى
ينبغي أن تقوم بمراجعة روتينية لحالة الربو لدى على الأقل مرة واحدة
كل عام. وساحضر مع:
• خطة عمل الربو لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى التحديث
• بخاخة الربو وأداة المباعدة للتأكد من استخدامي لها بأفضل طريقة
• أي أسلمة حول حالة الربو لدى وطريقة التكيف معها.
التاريخ التالي لمراجعة حالة الربو لدى: _____ / _____ / _____

الاتصال بالطبيب/الممرضة المتابعة لحالة الربو
الاسم: _____
رقم الهاتف: _____

رقم الاتصال في غير أوقات العمل
(أسأل طبيبك الجراح عن الشخص الذي تتصل به عندما لا يتاح الاتصال به)

الاسم: _____
رقم الهاتف: _____

احصل على المزيد من النصائح والدعم من جمعية
علاج الربو: Asthma UK

احصل على آخر الأخبار
في علاج حالات الربو حول إدارة
حالة الربو لديك على الهاتف رقم:
0300 222 5800



رقم الجمعية الخيرية المسجل Asthma UK © لعام 2016 في إنجلترا وويلز
802364 وفي أسكتلندا SCO39322

تاريخ آخر مراجعة وأخر تحديث في 2016؛ تاريخ المراجعة التالية في 2019.

*Adams et al; Factors associated with hospital admissions and repeat emergency department visits for adults with asthma; Thorax 2000;55:566-573



الرعاية اليومية لحالة الربو:

قياس ذروة التدفق لدى هو:

البخاخة الواقية

(أدخل الاسم/اللون):

أحتاج إلى استعمال البخاخة الواقية كل يوم حتى لو شعرت بتحسن

استنشق بخة (بخات) في الصباح

و بخة (بخات) في المساء.

البخاخة الملطفة

(أدخل الاسم/اللون):

استعمل البخاخة الملطفة فقط عند الحاجة إلى

استنشاق بخة (بخات) من البخاخة الملطفة إذا حدث شيء

ما يلي:

- أعاني من أريزز

- أعاني من ضيق بالصدر

- أجد صعوبة في التنفس

- أشعر بسعال

الأدوية الأخرى التي أتناولها لعلاج الربو كل يوم:

باتباع هذا النظام اليومي، أتوقع/أهدف إلى اختفاء الأعراض.

إذا لم تظهر أية أعراض أو شعرت بحاجة إلى استعمال

البخاخة الملطفة لمدة 12 أسبوعاً على الأقل، فسأطلب من

طبيبي أو من الممرضة المتابعة لحالة الربو لدى مراجعة

الأدوية في حالة إمكانية تقليل الجرعة.

i الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بحاجة إلى
الحرص الشديد حيث قد تكون نوبات الربو أكثر حدة.



عندما أشعر بتفاقم حالة الربو:

في نوبة الربو:




- بخاخة الربو الملطفة لا تساعدني أو أنتي بحاجة إلى المزيد كل ساعات
- أجد صعوبة في المشي أو التحدث
- أجد صعوبة في التنفس
- أعاني من قدر كبير من الأريزز أو أشعر بضيق بالصدر أو أعاني من السعال الكثير
- مقاييس ذروة التدفق لدى أقل من

فيما يلي بعض الإجراءات التي تتخذ على الفور في حالات الطوارئ

جلس باستقامة – لا تجلس مستلقية. حاول الحفاظ على هدوئك ①

استنشق بخة واحدة من بخاخة الربو الملطفة كل 30 إلى 60 ثانية بحد أقصى 10 بخات ②



- إذا شعرت بتحسن وحددت موعداً طارئاً في نفس اليوم:
 - أتأكد من الحصول على أقراص بريدينزيزولون للإغاثة السريعة (الإنقاذ)
 - إذا تم وصف هذه الأقراص لي، فيجب أن أتناولها كما وصف الطبيب أو الممرضة المتابعة لحالة الربو

تنبيه هام! معلومات نوبة الربو هذه غير مخصصة للأشخاص الذين يستخدمون خطة دواء SMART أو خطة دواء MART. إذا كنت ضمن خطة دواء SMART أو خطة دواء MART، فتحدث إلى طبيبك أو إلى الممرضة المتابعة لحالة الربو لديك للحصول على المعلومات الصحيحة حول نوبة الربو.

- أعاني من رجوع الأعراض مرة أخرى (الأرizzز، ضيق الصدر، الشعور بانحباس النفس، السعال)
- أستيقظ بالليل
- تتداخل الأعراض التي أعاني منها مع أنشطتي اليومية المعتادة (على سبيل المثال، في العمل، عند ممارسة التمارين الرياضية)
- أستخدم البخاخة الملطفة بمعدل مرات أسبوعياً أو أكثر
- مقاييس تدفق الذروة لدى ينخفض عن

هذا ما يمكنني فعله في الحال للسيطرة على حالة الربو لدى:

إذا لم أكن أستخدم البخاخة الواقية، فسأبدأ في استخدامها 1 بانتظام مرة أخرى أو:

زيادة جرعة البخاخة الواقية إلى بخة مرات يومياً حتى تخفي الأعراض التي أعاني منها ويعود قياس تدفق الذروة إلى معدله الطبيعي أستخدم البخاخة الملطفة حسب الحاجة (ما يصل إلى بخات كل أربع ساعات)

بالغ الأهمية! إذا لم أشعر بتحسن في غضون 24 ساعة، فسأحدد موعداً طارئاً لزيارة الطبيب أو الممرضة المتابعة لحالة الربو لدى.

إذا وصف لي أقراص بريدينزيزولون (أقراص ستيرود) للاحتفاظ بها في المنزل:

تناول ملجم من أقراص بريدينزيزولون (والتي تعادل 5 ملجم) في الحال وتكرار الجرعة كل صباح لمدة أيام أو حتى أشعر بتحسن تام.

بالغ الأهمية! أتصل بطبيبي أو بالممرضة المتابعة لحالة الربو اليوم وأخبرهم بأنني بدأت في تناول السترويدات وأحدد موعداً لزيارة في غضون 24 ساعة.